

PECTOFEED *plus*



**ZMNIĘSZA RYZYKO WYSTĄPIENIA ZABURZEŃ TRAWIENIA U CIELĄT
MOŻNA PODAWAĆ Z WODĄ LUB MLEKIEM**

- szybko i skutecznie stabilizuje procesy trawienne
- nie dopuszcza do odwodnienia
- osłania przewód pokarmowy
- dostarcza składników pokarmowych i energii

SKŁADNIKI AKTYWNE:

**PEKTYNY • MĄCZKA KAROB • ELEKTROLITY • WITAMINY • AMINOKWASY •
MIKROELEMENTY W POSTACI CHELATÓW • NIEZBĘDNE SKŁADNIKI ODŻYWCZE**

PRZEZNACZENIE:

Biegunki cieląt różnej etiologii, niestrawności pokarmowe, transport, stres.

WŁAŚCIWOŚCI:

Szybko stabilizuje pracę przewodu pokarmowego. Pektyny oraz skrobia ziemniaczana, pęczniczą wchłaniając wodę i tworzą warstwę osłaniającą jelita. Łatwo przyswajalne składniki pokarmowe utrzymują cielę w dobrej kondycji, a elektrolity nie dopuszczają do odwodnienia. Dostarcza także doskonale wchłaniane składniki witaminowo - mineralne, które mają zasadniczy wpływ na utrzymanie fizjologicznych funkcji organizmu i pobudzenie układu odpornościowego. Apetyczny zapach i smak powoduje, że jest chętnie pobierany przez cielęta z objawami biegunki. Podawany w stanach zagrożenia skutecznie zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki.

SKŁAD:

Dekstroza (glukoza) 13.2.2, serwatka suszona 8.17.1, pektyny 5.27.1, mączka karob 3.2.4, skrobia pszenna 13.3.1, skrobia ziemniaczana 13.3.2, białko ziemniaczane 4.8.10, chlorek sodu 11.4.1, chlorek potasu 11.5.1, wodorowęglan sodu 11.4.2, octan sodu (E262).

DODATKI/1KG: Dietetyczne, 3a: witaminy; 3b: mikroelementy; 3c: aminokwasy:

wit. A (E672)	50 000 j.m.	wit. C (E300)	1000mg	Zn -cynk E6 (chelat)	100mg	glicyna	30000mg
wit. D3 (E671)	10 000 j.m.	niacyna (wit. PP)	450mg	Se - selen E8 (selenin)	0,5mg	cholina (chlorek)	250mg
wit. E (E306)	100mg						

SKŁAD ANALITYCZNY: Popiół surowy 11,5%, Białko surowe 9,1%, Oleje i tłuszcze surowe 2,6%, Włókno surowe 2,9%. Wilgotność 4,6%. Ca 0,03%, Na 1,55%, P 0,2 %, K 0,94%.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

CIELĘTA Z BIEGUNKĄ: 100g preparatu **PECTOFEED plus** 2x dziennie po wymieszaniu w 2L ciepłej wody, mleka lub preparatu mlekozastępczego (temp. 38°C). Zwykle podawanie **PECTOFEED plus** przez 1-2 dni jest wystarczające. W razie potrzeby można podawać przez kilka kolejnych dni. Stosowanie **PECTOFEED plus** można rozpocząć po okresie podawania siary.

W STANACH ZAGROŻENIA: 50g preparatu **PECTOFEED plus** 1x dziennie po rozpuszczeniu w mleku lub preparacie mlekozastępczym (temp. 38°C).

AUTOMATY DO POJENIA: 3 kg preparatu na 25 kg preparatu mlekozastępczego.

NIE MA POTRZEBY PRZERYWAĆ PODAWANIA MLEKA

KARENCA: brak

PRZECHOWYWANIE: w suchym miejscu w temperaturze do 30°C.

OPAKOWANIE: 100g, 1kg, 3kg, 5kg

Producent: PBN Polska Sp. z o.o.

ul. Dekana 3, 64-100 Leszno, Tel/Fax : +48 65 529 94 65

pbn@pbn.ch www.pbn.ch Nr rej. wet αPL3063003p

Miejsce wytwarzania: 64-100 Leszno, ul. Jesionowa 7



LINIA STABILIZUJĄCA PRZEWÓD POKARMOWY