

RUMITOR GEL



**STABILIZACJA FIZJOLOGICZNYCH CZYNNOŚCI TRAWIENNYCH
SILNIE POBUDZA FUNKCJE TRAWIENNE I PRACĘ ŻWACZA
PASTA W TUBIE Z APLIKATOREM**

- **wzmaga kurczliwość mięśni żwacza i jelit**
- **wzmaga wydzielanie soków trawiennych**
- **odbudowuje osłabioną i zniszczoną mikroflorę żwacza**

SKŁADNIKI AKTYWNE:

**ZIOŁA (PIOŁUN, GORYCZKA, IMBIR, KMINEK, TATARAK, KORA KRUSZYNY)
SIARCZAN MAGNEZU • ŻYWE DROŻDŻE • MIKROELEMENTY (CHELATY)**

PRZEZNACZENIE:

Oslabiona praca przedżołądków i jelit, atonia i niedowład żwacza, wzdęcia, zaparcia. Brak apetytu.

WŁAŚCIWOŚCI:

Zioła działają pobudzająco na mięśniówkę żwacza i ruchy perystaltyczne przewodu pokarmowego. Wzmaga wydzielanie soków trawiennych, działa przeciwwzdęciowo i żółciopędnie. Żywe kultury drożdży oraz mikroelementy w formie chelatów efektywnie uczestniczą w odbudowie i wpływają na prawidłowe funkcjonowanie flory żwacza.

SKŁAD:

Produkty przetwarzania ziół (piołun, goryczka, imbir, kminek, tatarak, kora kruszyny) 13.1.9, siarczan magnezu 11.2.2, mączka karob 3.2.4, drożdże paszowe 12.1.5, propionian wapnia (E282), gliceryna roślinna (E422) 13.8.2, glikol propylenowy (E490) 13.11.1.

DODATKI/1kg: Dietetyczne 3a; mikroelementy 3b:

niacyna	30000mg	Zn E6 (chelate)	3750mg	Cu E4 (chelate)	1200mg
		Mn E5 (chelate)	2200mg	Co E3 (siarczan)	45mg

Zootechniczne 4a: żywe drożdże *Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94 CFU 17×10^{10} ; Technologiczne 1i: bentonit 70000mg; 1b: sorbinian potasu 1000mg; Sensoryczne 2b: substancje aromatyczne 1000mg.

SKŁAD ANALITYCZNY: Popiół surowy 54,2%, Białko surowe 1,2%, Oleje i tłuszcze surowe 5,1%, Włókno surowe 4,1%, Wilgotność 5,3%, Na 0%, Ca 1,5%, P 0%, Mg 2,3%.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Preparat podać doustnie. W razie potrzeby stosować przez 2-3 dni.

	BYDŁO DOROSŁE:	MŁODZIEŻ:
POBUDZENIE PRACY ŻWACZA:	50 - 100ml/szt./dzień	50ml/szt./dzień
POBUDZENIE APETYTU:	50ml/szt./dzień	25ml/szt./dzień

Uwaga: Ponownie preparat podawać po 8-12h.

Odpowiednią ilość preparatu odmierza się przekręcając pierścień umieszczony na tłoku.

Przy podawaniu pasty należy umieścić konus strzykawki w kącie pyska zwierzęcia, aby końcówka dotykała trzonu języka.

Przed zastosowaniem wskazane skonsultować się z lek. wet. lub specjalistą ds. żywienia.

PRZECIWSKAZANIA: Wysoka ciąża, skręt trawieńca.

KARENCA: nie wymagana

PRZECHOWYWANIE: w suchym miejscu w temperaturze do 30°C.

OPAKOWANIE: Tuba objętość netto 100 ml

Producent: PBN Polska Sp. z o.o.

ul. Dekana 3, 64-100 Leszno, Tel/Fax : +48 65 529 94 65

pbn@pbn.ch www.pbn.ch Nr rej. wet αPL3063003p

Miejsce wytwarzania: 64-100 Leszno, ul. Jesionowa 7

