

STOPOMIX forte

ZMNIĘDZA RYZYKO WYSTĄPIENIA ZABURZEŃ TRAWIENIA U CIELĄT
MOŻNA PODAWAĆ Z WODĄ LUB PASZĄ

- naturalna bariera dla patogenów
- szybko i skutecznie stabilizuje procesy trawienne
- ogranicza przenikanie wody do światła jelita
- działa ściągająco - uszczelnia śluzówkę
- łagodzi podrażnioną śluzówkę jelit
- neutralizuje toksyny
- wpływa na rozwój prawidłowej mikroflory jelit



SKŁADNIKI AKTYWNE:

- KORA KASZTANOWCA JADALNEGO • MĄCZKA KAROB • BABKA JAJOWATA

PRZEZNACZENIE:

Zaburzenia trawienia u bydła, trzody chlewnej i drobiu. Niestrawności pokarmowe, biegunki o różnej etiologii, transport, stres - okres odsadzenia od matek, zmiana karmy lub sposobu żywienia.

WŁAŚCIWOŚCI:

STOPOMIX forte przeznaczony jest dla zwierząt z problemami jelitowymi. Taniny działają ściągająco w obrębie przewodu pokarmowego tworząc cienką nierozpuszczalną warstwę. Związane z tanninami białka ochraniają błonę śluzową jelit przed działaniem czynników patogennych. Ograniczając przepuszczalność błony śluzowej dla wody blokuje odwodnienie organizmu. Taniny osłabiają działanie bakterii szkodliwych oraz hamują krwawienia w przewodzie pokarmowym, tworzą kompleksy z toksynami i powodują ich usuwanie z przewodu pokarmowego. Podawanie mieszanki zalecane jest w okresach wzmożonego ryzyka wystąpienia biegunek, zwłaszcza w czasie odsadzania, przegrupowań lub zmiany żywienia.

SKŁAD:

Produkty przetwarzania roślin (hydrolizowane taniny z *Castanea sativa* Mill., babka jajowata) 13.1.7, mączka karob 3.2.4, glukoza 13.2.2, produkty przetwarzania ziół (kora wierzby) 13.1.9. **DODATKI/1kg:** zootechniczne 4d: taniny *Castanea sativa*, sensoryczne 2b: substancje aromatyczne 1000mg. **SKŁAD ANALITYCZNY:** Popiół surowy 29,7%, Białko surowe 1,2%, Oleje i tłuszcze surowe 0%, Włókno surowe 3%, Wilgotność 6%, Ca 0,18%, Na 0,06%, P 0,03%, Lizyna 0%, Metionina 0%.

STOSOWANIE

BYDŁO – MŁODE I DOROSŁE: 0,2g/kg m.c. tj. 40-160g/szt./dzień przez 2-3 dni.

KROWY MLECZNE: 100g/szt./dzień przez 2-3 dni.

CIEŁĘTA: 10-30g/szt./dzień przez 2-3 dni. Dzienną dawkę można podać w 2 porcjach.

PROSIĘTA I WARCHLAKI: 0,2g/kg m.c./dzień tj. 2-4kg na 1T paszy przez 5-7 dni.

Zapobiegawczo w okresie odsadzenia (14-21 dzień życia): 3,5kg na 1T paszy.

MACIORY I TUCZNIKI: 0,2 g/kg m.c./dzień tj. 2-3,5kg na 1T paszy przez 7-10 dni.

DRÓB: 0,5-1,5kg na 1T paszy przez 5-7 dni

Przed zastosowaniem wskazane skonsultować się z lek. wet. lub specjalistą ds. żywienia.

KARENCA: nie wymagana

PRZECHOWYWANIE: w suchym miejscu w temperaturze do 30°C.

OPAKOWANIE: 100g, 1kg, 3kg

Producent: PBN Polska Sp. z o.o.

ul. Dekana 3, 64-100 Leszno, Tel/Fax : +48 65 529 94 65

pbn@pbn.ch www.pbn.ch Nr rej. wet αPL3063003p

Miejsce wytwarzania: 64-100 Leszno, ul. Jesionowa 7

