

# B-CAROTIN GEL

**WSPIERANIE PRZYGOTOWAŃ DO RUI I REPRODUKCJI****POBUDZA CYKL PŁCIOWY I NASILA MANIFESTACJĘ OBJAWÓW RUI**

- poprawa manifestowania objawów rui
- lepsza implantacja zarodków
- lepsze wskaźniki rozrodu

**SKŁADNIKI AKTYWNE:****ZIOŁA I EKSTRAKTY Z ROŚLIN LECZNICZYCH • β-KAROTEN****WITAMINY: A, D3 i E • NIACYNA****MIKROELEMENTY: CHELATY - CYNK, MANGAN, MIEDŹ • KOBALT • JOD • SELEN****PROBLEM:**

Wspieranie przygotowań do rui i reprodukcji. Ciche i nieregularne ruje, brak rui. Słaba skuteczność inseminacji. Niedobory mineralno-witaminowe, pogorszenie wskaźników rozrodu.

**WŁAŚCIWOŚCI:**

**B-CAROTIN GEL** zawiera zioła i wyciągi ziołowe o właściwościach estrogennych, mikroelementy w postaci chelatów, witaminy oraz β-karoten. Zawarte składniki biorą udział w procesach syntezy enzymów oraz hormonów płciowych i dzięki temu zapobiegają wystąpieniu zaburzeń w reprodukcji. Preparat przyczynia się do wystąpienia wyraźnych objawów rui i wpływa korzystnie na skuteczność inseminacji, pobudzenie cyklu hormonalnego i lepszą implantację zarodków, skraca okres międzywycieleniowy.

**SKŁAD:**

**MATERIAŁY PASZOWE:** Produkty przetwarzania ziół (lukrecja gładka, imbir) 13.1.9, gliceryna roślinna (E422) 13.8.2, glikol propylenowy (E490) 13.11.1, mączka karob 3.2.4, sorbitol 13.5.5.

**DODATKI/1kg:**

Dietetyczne-3a

<u>witaminy:</u>	10000000 j.m.
Wit. A (E672)	2500000 j.m.
Wit. D3 (E671)	25000mg
Wit. E (E306)	5000mg
B-karoten	5000mg
Niacyna (wit. PP)	

**3b Mikroelementy:**

Cynk E6 (chelate)	25000mg
Mangan E5 (chelate)	11000mg
Miedź E4 (chelate)	6000mg
Kobalt E3 (siarczan)	105mg
Jod E2 (jodek)	1000mg
Selen E8 (selenin)	90mg

Technologiczne 1b: sorbinian potasu 1000mg; Sensoryczne 2b: substancje aromatyczne 1000mg.

**SKŁAD ANALITYCZNY:** Popiół surowy 32,2%, Białko surowe 1,1%, Oleje i tłuszcze surowe 0,01%, Włókno surowe 1,5%, Wilgotność 28,8%. P 0,1%, Ca 0,1%, Na 0,0%.

**STOSOWANIE:**

**KROWY:** Podawać doustnie 100ml preparatu na 2 do 4 tyg. przed inseminacją. Poporodowe przygotowanie do inseminacji: 1. podanie: 2-4 tyg. po porodzie, 2. podanie: 2-4 tyg. przed inseminacją.

**UWAGA:** Przerwać podawanie gdy pojawią się objawy rujowe.

Uwaga: Przed zastosowaniem wskazane skonsultować się z lek. wet. lub specjalistą ds. żywienia.

**PRZECIWSKAZANIA:** nie podawać krowom w ciąży.

**KARENCAJA:** nie wymagana

**PRZECHOWYWANIE:** w suchym miejscu w temperaturze do 30°C.

**OPAKOWANIE:** tuba a' 100ml

PBN Polska Sp. z o.o.

ul. Dekana 3, 64-100 Leszno

Tel/Fax : 65 5299465 Nr rej. wet. αPL3063003p

www.pbn.ch pbn@pbn.ch

