

# HYDROPAST



**STABILIZACJA RÓWNOWAGI WODNO-ELEKTROLITOWEJ  
W CELU WSPARCIA FIZJOLOGICZNYCH CZYNNOŚCI TRAWIENNYCH  
MOŻNA PODAWAĆ Z WODĄ, MLEKIEM LUB BEZPOŚREDNIO DO PYSKA**

- **zapobiega odwodnieniu**
- **dostarcza elektrolitów i energii**
- **redukuje negatywne działanie stresu**
- **wspomaga regenerację błony śluzowej jelit**

**SKŁADNIKI AKTYWNE:**

**GLUKOZA • LAKTOZA • CHLOREK SODU • CHLOREK POTASU • OCTAN SODU  
WODOROWĘGLAN SODU • GLICYNA • BETAINA • TAURYNA • WITAMINA C  
WYCIĄGI Z ROŚLIN LECZNICZYCH (OREGANO, ROZMARYN, TYMIANEK)**

**PRZEZNACZENIE:**

W przypadku zagrożenia zaburzeniami trawiennymi (biegunką), w trakcie takich zaburzeń lub w okresie rekonwalescencji po ich przebyciu. Stabilizacja bilansu elektrolitów i wody, zapobieganie odwodnieniu organizmu (biegunka), utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej.

**WŁAŚCIWOŚCI:**

Przeznaczony dla cieląt osłabionych w wyniku przebytych zaburzeń ze strony układu pokarmowego. Wyciągi ziołowe optymalizują trawienie i stabilizują pracę jelit. Dodatek aminokwasów i tauryny wspomaga regenerację uszkodzonego nabłonka i sprzyja efektywnemu wchłanianiu elektrolitów i cukrów. Wzmaga apetyt, stymuluje wypijanie mleka.

**SKŁAD:**

Glukoza 13.2.2, laktoza 8.9.1, chlorek sodu 11.4.1, chlorek potasu 11.5.1, chlorek magnezu 11.2.6, wodorowęglan sodu 11.4.2, octan sodu (E262), cytrynian sodu (E331), gliceryna 13.8.2.

**DODATKI/1kg:** Dietetyczne 3a witaminy; 3c aminokwasy:

Wit. C	10000mg	glicyna	10000mg	betaina	10000mg	tauryna	5000mg
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Sensoryczne 2b: wyciągi z roślin 15000mg: oregano (CoE317), rozmaryn (CoE406), tymianek (CoE456), substancje aromatyczne 1000mg. **SKŁAD ANALITYCZNY:** Popiół surowy 21%, Białko surowe 0,2%, Oleje i tłuszcze surowe 0,1%, Włókno surowe 0,1%, Wilgotność 39%. Ca 0%, P 0%, Na 6,5%, K 2,1 %, Mg 0,5%. Chlorki 4,8%, Cukry 26%.

**INSTRUKCJA UŻYCIA:**

**CIEŁĘTA:** 20-25ml/szt. wymieszać w 1L ciepłego mleka lub wody. Cielętom z brakiem apetytu podać bezpośrednio do pyska. Powtórzyć po 12h. Można podawać przez okres 3-5 dni.

Odpowiednią ilość preparatu odmierza się przekręcając pierścień umieszczony na tłoku. Przy podawaniu pasty należy umieścić konus strzykawki w kącie pyska zwierzęcia, aby końcówka dotykała trzonu języka.

Uwaga: Przed zastosowaniem wskazana konsultacja z lek. wet. lub specjalistą ds. żywienia.

**KARENCA:** nie wymagana

**PRZECHOWYWANIE:** w suchym miejscu w temperaturze do 30°C.

**OPAKOWANIE:** Tuba objętość netto 100ml

**Producent:** PBN Polska Sp. z o.o.

ul. Dekana 3, 64-100 Leszno, Tel/Fax : +48 65 529 94 65

pbn@pbn.ch www.pbn.ch Nr rej. wet αPL3063003p

Miejsce wytwarzania: 64-100 Leszno, ul. Jesionowa 7

