

ELECTROCID



**STABILIZACJA RÓWNOWAGI WODNO-ELEKTROLITOWEJ
W CELU WSPARCIA FIZJOLOGICZNYCH CZYNNOŚCI TRAWIENNYCH
PROSZEK MUSUJĄCY DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU NAWADNIAJĄCEGO DLA CIELĄT I PROSIĄT
DO PODAWANIA Z WODĄ LUB MLEKIEM**

- dostarcza elektrolitów i energii
- wspomaga regenerację błony śluzowej jelit
- zapewnia higieniczność mleka

SKŁADNIKI AKTYWNE:

**GLUKOZA • LAKTOZA • CHLOREK SODU • CHLOREK POTASU
WODOROWĘGLAN SODU • GLICYNA • WITAMINA C**

PROBLEM:

W przypadku zagrożenia zaburzeniami trawiennymi (biegunką), w trakcie takich zaburzeń lub okresie rekonwalescencji po ich przebyciu. Stabilizacja bilansu elektrolitów i wody, zapobieganie odwodnieniu organizmu spowodowanym biegunką, utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej, przygotowanie zwierząt do transportu.

WŁAŚCIWOŚCI:

Uzupełnia elektrolity oraz energię, przywracając do normy gospodarkę wodno-elektrolitową oraz kwasowość organizmu. Kwasy organiczne zapewniają odpowiednie "ścianienie" mleka i higieniczność mleka. Glicyna wspomaga regenerację uszkodzonego nabłonka i sprzyja efektywnemu wchłanianiu elektrolitów i substancji odżywczych.

SKŁAD:

Dekstroza (glukoza) 13.2.2, wodorowęglan sodu 11.4.2, chlorek sodu 11.4.1, chlorek potasu 11.5.1.

DODATKI/1kg: dietetyczne, aminokwasy 3c:

glicyna	10000mg
---------	---------

Technologiczne, 1a: kwas mlekowy (E270), kwas cytrynowy (E330), kwas ortofosforowy (E338), kwas mrówkowy (E236), krzemionka (E551a), krzemian glinowo-sodowy (E554). Technologiczne 1i: bentonit (E562) 15000mg. Sensoryczne 2b: substancje aromatyczne 1000mg.

SKŁAD ANALITYCZNY: Białko surowe 0%, Oleje i tłuszcze surowe 0%, Popiół surowy 21,19%, Wilgotność: 7,36%, Na 6,78%, K 1,57 %, Chlorki 5,98%, Cukry 38%. Lizyna 0%, Metionina 0%.

STOSOWANIE:

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU: 40g ELECTROCID/1-2L wody lub mleka (37°C).

CIELĘTA: 1-2L roztworu 2-3x dziennie przez 2-3 dni.

NIE MA POTRZEBY PRZERYWAĆ PODAWANIA MLEKA

PROSIĘTA SSAĆCE: 1-2L roztworu/miot 2-3x/dzień przez 2-3 dni. (2-4g/szt.).

PROSIĘTA ODSADZONE: 0,25-0,5L roztworu/szt. przez 2-3 dni. (12g/szt.).

UWAGA: W przypadku stwierdzenia biegunki przygotowany roztwór natychmiast podawać do picia zwierzętom. Roztwór należy zużyć w ciągu 24 godzin.

Przed zastosowaniem wskazane skonsultować się z lek. wet. lub specjalistą ds. żywienia.

KARENCA: nie wymagana

PRZECHOWYWANIE: w suchym miejscu w temperaturze do 30°C.

OPAKOWANIE: saszetka 100g, 1kg, 3kg.

Producent: PBN Polska Sp. z o.o.

ul. Dekana 3, 64-100 Leszno, Tel/Fax : +48 65 529 94 65

pbn@pbn.ch www.pbn.ch Nr rej. wet αPL3063003p

Miejsce wytwarzania: 64-100 Leszno, ul. Jesionowa 7

